




NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO


- **Neurônio: a unidade do sistema nervoso**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

- Classificação funcional



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – direção dos impulsos:


- Impulsos sensoriais originados de receptores são conduzidos ao SNC por neurônios sensoriais ou aferentes.
- Impulsos motores originados no SNC são conduzidos ao músculo/glândula por neurônios motores ou eferentes. Podem ser somáticos (não-visceral) ou autônomos (visceral).

- Neurônios de associação/interneurônios são localizados entre neurônios motores e sensoriais na medula e encéfalo.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO



Receptores da dor = nociceptores

Amplamente espalhados em todos os tecidos, com a exceção do tecido nervoso!!


Terminações livres

Térmicos
Mecânicos
Químicos



NEUROCIÊNCIA DA DOR


INTRODUÇÃO



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

INTERNEURÔNIOS




NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

Fibras A Delta

- Mielinizadas
- Diâmetro intermediário
- Alta Velocidade de condução
- Baixo limiar de ativação
- Modulam a primeira fase da dor




NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

Fibras A Beta

- Mielinizadas
- Grande diâmetro
- Alta Velocidade de condução
- Baixo limiar de ativação
- Responsáveis pelas sensações inócuas




NEUROCIÊNCIA DA DOR


INTRODUÇÃO

Fibras C

- Amielínicas ou pouco mielinizadas
- Velocidade de condução lenta
- Responsáveis pela dor difusa



NEUROCIÊNCIA DA DOR

Axônios cutâneos	$A\alpha$	$A\beta$	$A\delta$ Fibra A delta	C Fibra C
				
Diâmetro (μm)	13–20	6–12	1–5	0,2–1,5
Velocidade (m/s)	80–120	35–75	5–30	0,5–2
Receptores sensoriais	Proprioceptores musculares	Mecanorreceptores do tato	Temperatura não nociva e nociceptores	Temperatura não nociva e nociceptores




NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ≠ DOR

NOCICEÇÃO

Transmissão e reconhecimento de impulsos em resposta a um estímulo nocivo.

Nociceptores: informam o cérebro que o corpo está em perigo.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

A REDE NEURAL E OS MECANISMOS DE DOR:

UM RESUMO

INTRODUÇÃO

Mecanismos:

- De entrada (transdução, transmissão)
- De processamento (modulação)
- De saída (percepção e resposta)

Estímulos Nocivos



Transduç

Transmissão
o
Periférica

Nociceptores


Fibra
aférente

Medula Espinhal



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

NEUROTRANSMISSORES: EXCITATÓRIOS E INIBITÓRIOS

EXCITATÓRIOS:


Despolarizam a membrana pré-sináptica; ativam canais de Ca^{++}

- _ Substância P
- _ Glutamato (Glu)

INIBITÓRIOS:

Hiperpolarizam a membrana; ativam canais de potássio K^+ ; inibem os canais de cálcio.

- _ Serotonina, Norepinefrina,
- _ Endorfinas, GABA




NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO


Nociceptiva Ascendente	Inibitória Descendente
Substância P Prostaglandinas	Serotonina Norepinefrina

O cérebro envia mensagens para baixo, para a medula espinhal, que podem diminuir ou aumentar as mensagens de perigo que chegam à medula espinhal.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO



ÁREAS DO SNC, SUAS FUNÇÕES E ASSOCIAÇÕES

	ÁREA	FUNÇÃO
1	Córtex pré-frontal	Solução de problemas, memória e percepção da dor.
2	Ínsula	Julgamento da sensação dolorosa e reações emocionais.
3	Amígdala	Aprendizado e memória das reações emocionais, da dor e do medo.
4	Córtex motor e pré-motor	Preparo, organização e execução do movimento.
5	Córtex sensorial	Identificação da região corporal dolorida.
6	Giro do cíngulo anterior	Antecipação da dor e respostas cognitivas, motoras e de atenção.
7	Tálamo e hipotálamo	Organização, recepção e transmissão da dor para o córtex cerebral, respostas ao estresse, autonômicas e motivação.
8	Cerebelo	Cognição e movimento.
9	Hipocampo	Respostas ao estresse, medo e memória.
10	Corno posterior da medula	Transmissão e modulação aos centros superiores.

NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO

- 40% das pessoas sofrem de Dor CRÔNICA;



A catastrofização, cinesiofobia, ansiedade, depressão e falta de apoio social podem contribuir as queixas e persistência dos sintomas

- **Dor CRÔNICA: 1) Condição Grave, 2) Mal Entendida, 3) Mal Diagnosticada e 4) Subtratada.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - DEFINIÇÃO

- **Uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial.**



IASP

International Association for the Study of Pain



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEFINIÇÃO


- A dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada, em graus variáveis, por fatores biológicos, psicológicos e sociais.
- Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos.
- Através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor.;
- **O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado.**
- **Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico.**
- **A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor; a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - REFLEXÃO DIDÁTICA



- A dor é uma “prestação de serviço” adequado ou desproporcional que pode ser realizado isoladamente, porém na maior parte das vezes está acompanhada.
- A “prestação de serviço” é dependente de uma solicitação real ou potencial.
- **A “prestação de serviço” tem a sua hospedagem e atuação no sistema nervoso central.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - AS VIAS DA DOR

- Uma informação nociceptiva (input nociceptivo) pode ser Térmica, Mecânica ou Química (detectável ou não)
- **As informações nociceptivas (input nociceptivo) aferentes entram no cérebro a partir da medula espinhal**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - AS VIAS DA DOR

- Melzack e Casey sugerem três vias para a dor:
- 1) Sensório Discriminativa
- 2) Afetiva Emocional
- 3) Cognitiva Avaliativa.




NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - AS VIAS DA DOR

SENSÓRIO DISCRIMINATIVA (ÁREA DO CÉREBRO: CÓRTEX SOMATOSSENSORIAL)

- Se refere a sensação da dor: **Intensidade, Duração, Localização e Qualidade (Choque, Pontada, Queimação).**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - AS VIAS DA DOR

AFETIVO EMOCIONAL (ÁREA DO CÉREBRO: SISTEMA LÍMBICO)

- Se refere experiência desagradável com a percepção da dor.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - AS VIAS DA DOR COGNITIVA AVALIATIVA (ÁREA DO CÉREBRO: CÓRTEX PRÉ-FRONTAL)

- Se refere as experiências, exemplos e regras.
- Baseado nas crenças do paciente.
- **Pode modular as vias Sensório Discriminativa e Afetiva Emocional.**
- **Pode afetar positivamente ou negativamente o resultado da “prestação de serviço”.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - INTERLIGAÇÃO DAS TRÊS VIAS DA DOR


- As três vias: CÓRTEX SOMATOSSENSÓRIAL-AFETIVO EMOCIONAL-COGNITIVA AVALIATIVA.
- As três vias estão LIGADAS e INTERAGEM
- **Não é possível existir Dor sem uma solicitação Real ou Potencial.**
- **Não é possível existir Dor sem SABER e SENTIR.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - EMOÇÃO e ATENÇÃO


- **Emoção e Atenção** modulam a dor. As vias de modulação são diferentes.
- **EMOÇÃO**: modulação via **AFETIVO EMOCIONAL** (altera a experiência desagradável).
- **ATENÇÃO**: modulação via **SENSÓRIO DISCRIMINATIVA** (altera principalmente a sensação de intensidade da dor).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - ESTRUTURA DO CÉREBRO


- A Dor **CRÔNICA** provoca diminuição tanto na Substância Cinzenta como na Substância Branca do Córtex Cerebral.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - ESTRUTURA DO CÉREBRO

- Na Dor CRÔNICA algumas áreas do cérebro ficam ativadas com mais frequência.




- **Não existe um local específico de Dor no cérebro.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - ESTRUTURA DO CÉREBRO


- **O processamento da dor no cérebro envolve uma rede de estruturas que conferem à experiência dolorosa um caráter pessoal, uma assinatura.**
- **Áreas do cérebro ativadas no processamento na dor. Essas áreas têm outras funções além do processamento das ameaças.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CONCEITO - ESTRUTURA DO CÉREBRO


Focado na dor
↓
Sistema de saliência



Ínsula
Córtex cingulado médio
Junção temporoparietal
Córtex pré frontal dorsolateral

Distraído

Sistema rede modo padrão



Córtex cingulado posterior
Lobo parietal lateral
Áreas do lobo temporal medial
Córtex pré frontal medial


Opinion

CellPress

The dynamic pain connectome

Aaron Kucyi^{1,2} and Karen D. Davis^{1,2,3,4}

Focado em outra situação
↓



Córtex pré frontal medial
Substância cinzenta periaquedual
Medula rostro-ventral



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEPÇÃO ≠ DOR

- Nocicepção e Dor são diferentes.
- Nociceptores são receptores sensoriais especializados.
- Os nociceptores são ativados por Estímulos Nocivos.
- Existem nociceptores que são ativados por estímulos mecânicos, térmicos e polimodais (mecânicos, térmicos e químicos).
- **Devido as diferentes tipos de nociceptores, a propagação da dor tem duas etapas com características (intensidade e tempo) diferentes. No início (Primeira Dor – nociceptores mecânicos e térmicos), a dor é muito intensa e com curta duração. Em seguida (Segunda Dor – nociceptores polimodais), vem uma dor prolongada (lenta/surda) mas com uma intensidade menor.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ≠ DOR

NOCICEPTORES e a SOPA INFLAMATÓRIA

Estímulos nocivos são traduzidos pelos nociceptores



Mediadores químicos

“sopa inflamatória”

- Prostaglandinas
- Leucotrienos
- Substância P
- Histamina
- Bradicina
- Serotonina
- Hidroxiácidos
- Espécies reativas ao oxigênio
- Citocinas inflamatórias e quimiocinas

Receptores/canais nos nociceptores



Substâncias chamadas de “algogênicas” (que produzem dor) São muito importantes para resolver o processo inflamatório





NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ≠ DOR

Dor




Forma como a sensação é experimentada




NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEPÇÃO ≠ DOR



NEUROCIÊNCIA DA DOR



NOCICEPÇÃO ≠ DOR



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ≠ DOR

Sistema da Coluna Antero-Lateral




SISTEMA DA COLUNA ANTERO-LATERAL

- a) Trato espiño-talâmico lateral (NEO)
Dor rápida e bem localizada
- b) Trato espiño-(retículo)talâmico (PALEO)
Dor lenta e difusa



NEUROCIÊNCIA DA DOR



Vias ascendentes:

a) A via espinocerebelar (esquerda) transmite informações de propriocepção inconsciente para o cerebelo.

A via funículo posterior-lemnisco medial transmite o tato discriminativo e sinais de propriocepção consciente para o córtex cerebral.

b) A via espiñotalâmica transmite sensibilidade não discriminativa (dor, temperatura, pressão) para o córtex somestésico primário.




NEUROCIÊNCIA DA DOR

Sensibilização Primária

NOCICEPÇÃO ≠ DOR


- Você machucou sua coluna lombar. Os sensores da região machucada ficaram com maior sensibilidade.
- Essa alteração pode fazer com que até mesmo um leve toque na área lesada, os movimentos gerassem uma resposta nociceptiva.
- Quando os tecidos se curam, a dor desaparece.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEPÇÃO ≠ DOR – NOCICEPTORES SALIENTES – DOR REFERIDA VISCERAL

- A dor de uma disfunção visceral é percebida como originada em uma região da superfície do corpo.
- O que justifica a produção de dor referida é a convergência de sinais somáticos e viscerais.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ➡ DOR – MEDULA ESPINHAL - DISTORÇÃO

- A medula espinhal pode distorcer a realidade sobre a condição de um tecido.
- O motivo da distorção é o aumento da sensibilidade provocada pela maior presença de substâncias químicas nas sinapses.
- Desta forma, o cérebro recebe Fake News sobre o real estado dos tecidos.




NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ➡ DOR – MEDULA ESPINHAL - DISTORÇÃO

SEROTONINA E NOREPINEFRINA

Emotional and Painful Physical Symptoms: A Shared Neurochemical Link in Depression?



- **Uma desregulação da 5-HT e da NE no cérebro é fortemente associada à depressão.**
- **Por causa desse desequilíbrio de 5-HT e NE na medula espinhal, o cérebro pode perceber a dor com sinal amplificado.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ≠ DOR – ESTÍMULO

- O estímulo nocivo (mecânico, térmico ou químico) é convertido, por receptores (chamados TRP – potencial de receptor transitório) presentes na membrana do nociceptor, em um potencial elétrico despolarizante.
- Os receptores presentes na membrana do nociceptor determinam a variedade de percepção.




NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ≠ DOR – ESTÍMULO

Modulação Ascendente na Medula

Estímulos sensoriais suaves (massagem, por exemplo) competem com os estímulos nocivos na medula.

Assim, a medula faz parte do nosso sistema de controle interno da dor.




- Teoria das Comportas da Dor
- Melzack e Wall (1965)



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEPÇÃO ≠ DOR – ESTÍMULO


- O descontrole da ativação dos nociceptores possui relação com patologias (mal adaptativas ou disfuncionais).
- ALODINIA e HIPERALGESIA são dois estados dolorosos que ocorrem em virtude de alterações na atividade dos nociceptores.
- ALODINIA = Estímulos não nocivos podem ser interpretados como nocivos.



NEUROCIÊNCIA DA DOR


NOCICEPÇÃO ≠ DOR – ESTÍMULO – CORNO DORSAL – LÂMINAS DE REXED

- Os corpos dos neurônios sensoriais estão nos gânglios da raízes dorsais, mas eles continuam com ramificações pela raiz dorsal até o corno dorsal onde terminam de forma organizadas em lâminas (I, II, III, IV, V e VI).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

NOCICEÇÃO ➡ DOR – ESTÍMULO – CORNO DORSAL – LÂMINAS DE REXED



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CRONOLÓGICO – DOR: BOA ou RUIM

AGUDA <3 meses (Finalidade Boa: proteger e avisar que tem alguma coisa errada):

- 1) sintoma;
- 2) fácil de explicar;
- 3) melhor aceitação;
- 4) envolve lesão tecidual;
- 5) sistema nervoso íntegro;

• **CRÔNICA** > ou = 3-6 meses (Finalidade Ruim: não é para proteger e geralmente está acompanhado de outras desordens):

- 1) doença;
- 2) difícil de explicar;
- 3) menor aceitação;
- 4) menor relação com lesão tecidual;
- 5) sistema nervoso disfuncional



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CRONOLÓGICO – DOR: BOA ou RUIM

- AGUDA <3 meses (Finalidade Boa: proteger e avisar que tem alguma coisa errada):

6) sistema de movimento: mecanismo comportamental de proteção natural;

- **CRÔNICA > ou = 3-6 meses (Finalidade Ruim: não é para proteger e geralmente está acompanhado de outras desordens):**

6) sistema de movimento (moderado por fatores psicossociais): padrão comportamental mal adaptativo com perda de função fisiológica de alerta;



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CRONOLÓGICO – DOR: BOA ou RUIM

- AGUDA <3 meses (Finalidade Boa: proteger e avisar que tem alguma coisa errada):

7) tem um tempo de início bem definido com patologia clara;

- **CRÔNICA > ou = 3-6 meses (Finalidade Ruim: não é para proteger e geralmente está acompanhado de outras desordens):**

7) o tempo não deve ser o único parâmetro para classificar a dor como crônica, principalmente nos casos em que o tempo de cura tecidual é = ou < que 3-6 meses;



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CRONOLÓGICO – DOR: BOA ou RUIM

- AGUDA <3 meses (Finalidade Boa: proteger e avisar que tem alguma coisa errada):

8) tempo normal de cicatrização do tecido/as alterações são proporcionais aos achados físicos ou lesão/a dor ocorre na presença de dano tecidual detectável (onde dói).

- **CRÔNICA** > ou = 3-6 meses (Finalidade Ruim: não é para proteger e geralmente está acompanhado de outras desordens):


8) **supera o tempo normal de cicatrização do tecido/as alterações são maiores do que o esperado a partir dos achados físicos ou lesão/a dor pode ocorrer na ausência de dano tecidual identificável (onde dói).**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CRONOLÓGICO – DOR: BOA ou RUIM – TECIDO OU SISTEMA NERVOSO

- A dor pode ter persistência mesmo se o tecido já foi reparado.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

CRONOLÓGICO – DOR: BOA ou RUIM – DOENÇA

- A dor pode ser entendida como uma doença.
- A dor aguda é somente um “alarme”, já a dor crônica tem perda dessa função.



Passado o susto ou quando estiver fora de perigo, o sistema de alarme retorna para o seu estado de repouso pronto para adverti-lo de um novo perigo adicional.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

MECANISMO – DOR

- **NOCICEPTIVO**: a dor é provocada por ativação de nociceptores numa lesão real ou potencial ao tecido (exceto tecido neural).

Exemplos:

- 1) Tensão tecidual
- 2) **Químico** (não inflamatório) – aumento de ácido lático devido a fadiga de uma postura.
- 3) **Químico** (inflamatório) – lesão com inflamação presente.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

MECANISMO – DOR

- **NEUROPÁTICO**: a dor é provocada por uma lesão ou doença do sistema nervoso (somatossensorial).

Exemplos:

- 1) Tensão tecidual.
- 2) Químico (inflamatório) – lesão com inflamação presente.



NEUROCIÊNCIA DA DOR


MECANISMO – DOR

- **NOCIPLÁSTICO**: a dor do paciente vem principalmente não de lesões perceptíveis (nociceptiva ou neuropático) mas sim de microalterações nos ambientes neuronais e disfunções na percepção (**fatores psicológicos, sociais e ambientais**) de dor pelo paciente.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

INTRODUÇÃO



NEUROCIÊNCIA DA DOR

MECANISMO – DOR

- NOCIPLÁSTICO:

Dor nociplástica

"Dor que se origina de nocicepção alterada apesar de não haver clara evidência de dano tecidual real ou ameaça de dano causando ativação de nociceptores periféricos ou evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial causando dor" (IASP 2019)



Sensibilização central

"Capacidade de resposta aumentada de neurônios centrais a entrada de receptores unimodais e polimodais"(R. Meures e col/ Melzack e Wall 2013)

- Hiperalgesia;
- Alodinia;
- Dor difusa;
- Experiência desproporcional em relação à dor;
- Hipersensível a luz, sons, cheiros e até mesmo paladar;
- Alterações do sono;
- Fadiga;
- Dificuldade de concentração.

NEUROCIÊNCIA DA DOR

MECANISMO – DOR


- MISTO: é a sobreposição dos mecanismos, em qualquer combinação, para causar dor na mesma área do corpo.
- MISTO: pode ocorrer predominância de um dos mecanismos.
- **MISTO: a predominância pode ocorrer em qualquer momento na linha do tempo da dor, ou seja, a dor mista pode ser aguda ou crônica.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS

- **SENSAÇÃO NORMAL**
 _Estímulos de baixa intensidade só ativam as sensações inócuas (TOQUE).
 _Estímulos de alta intensidade ativam nociceptores que podem levar a DOR.
 _A via do TOQUE não é a mesma via da DOR, e estas vias não se cruzam.




NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS

- SENSACÃO NORMAL

_A Dor 'Normal'

_A percepção da dor nos protege, pois nos alerta sobre os perigos.




NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS

- SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

_É o aumento da eficácia sináptica, amplificando a resposta da dor a estímulos nocivos. Isso acontece na via da DOR, resultando em HIPERALGESIA.

_A via do TOQUE não é a mesma via da DOR, MAS com o fenômeno neurofisiológico (Sensibilização Central) estas vias se cruzam resultando em ALODINIA.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS


- SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

_Portanto, o Sistema Nervoso Central vai DISTORCER ou AMPLIFICAR a Dor.

_Não refletindo a verdade sobre o estímulo nocivo, mas sim o estado funcional do sistema nervoso central.

_Fica claro que para produzir dor não é necessário que o estímulo seja nocivo.

- **O fenômeno neurofisiológico (sensibilização central) pode ocorrer em qualquer mecanismo de dor (nociceptivo, neuropático e nociplástico).**



NEUROCIÊNCIA DA DOR


DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS

- SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

_ALODINIA e HIPERALGESIA são estados de dor que demonstram alterações na atividade dos nociceptores.


_Agudo ou Crônica.

_Sensibilização do Sistema Nervoso Periférico e Central (nível medular e nível supra medular).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS



- SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

_NEUROTAG ou NEUROASSINATURA é um Trilho de Dor ou Bloqueio.

_NEUROTAG é resultado da 1) eficácia sináptica, 2) número de células envolvidas e 3) precisão de suas conexões.

_NEUROTAG pode ser fortalecida pela repetição ou pela relevância para sobrevivência.

_Portanto, NEUROTAG é um conjunto lógico de sequências de ativação de neurônios, com o objetivo ligarem suas luzes para a dor aparecer.



NEUROCIÊNCIA DA DOR


DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS

- A meio século atrás a prestigiosa revista Science publicou Gate Control Theory de autoria de Ronald Mezzack e Patrick Wall. A teoria propunha que a dor é modulada pelo cérebro.
- Imagine você recebendo uma facada. Porém, a facada não era a única coisa que estrava acontecendo naquele momento (pensamentos, cheiro, visão, som – constituíam você (Body Self) naquele momento.
- **“Isso tudo” era você ao ser agredido por uma faca. E assim, a lesão tecidual foi obrigada a ser juntar com “isso tudo” para produzir a dor.**
- **Resumindo, o que você ao ser agredido por algo, dá significado a experiência doloroso, tornando-a única, totalmente “sua própria”.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

Sensibilização Periférica



Hiperalgisia Primária

Amplificação a intensidade de dor causada por um estímulo nódico térmico ou mecânico

Alodinia Primária

Presença de percepção de dor causada por um estímulo não nódico toque leve, ou seja um terminação nervosa livre "silencioso" que tem o limiar reduzido pela presença da "sopa inflamatória"



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – MECANISMO & FENÔMENOS - CONSIDERAÇÕES


- Sensibilização Central não é sinônimo de Dor Nociplástica. Nociplástico é um MECANISMO da Dor. Sensibilização Central é um FENÔMENO NEUROFISIOLÓGICO que pode ocorrer em um MECANISMO da Dor.
- **Sensibilização Central não é sinônimo de Dor Crônica. Esse FENÔMENO NEUROFISIOLÓGICO pode ocorrer tanto na Fase AGUDA (condição normal) como na Fase CRÔNICA (condição disfuncional).**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – FENÔMENOS NEUROFISIOLÓGICOS

- SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL x ESTRESSE



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR - CONSIDERAÇÕES


- A dor é processada no cérebro ao nível cortical, onde acontece a consciência da sensação.
- A dor é modulada pelas estruturas espinhais e subcorticais do tronco cerebral.
- A dor também pode ser modulada pelos hormônios (cortisol, estradiol) e fatores liberados por fibras musculares (ATP, lactato).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – ESTADO SIMPATICOTONICO

- O cérebro solicita vários “serviços”, além da dor, que atuam simultaneamente para proteger de um perigo real ou potencial.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – BLOQUEIOS NEUROBIOLÓGICOS

- Mudar a PERCEPÇÃO resulta em: 1) diminuição do estresse, 2) diminuição da ansiedade, 3) melhor qualidade de vida, 4) restabelecer padrões comportamentais mal adaptativos (cognitivo e movimento), 5) modular a dor.



- **BLOQUEIOS NEUROBIOLÓGICOS** determinam se a DOR será sentida ou não.

OB&: a dor depende do grau de ameaça percebido (PERCEPÇÃO).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – BLOQUEIOS NEUROBIOLÓGICOS

- A captura visual pode alterar a PERCEPÇÃO.
- Estudo demonstra resultados de pacientes submetidos a microdissectomia lombar. Após o procedimento os fragmentos do disco foram mostrados para alguns pacientes. Estes obtiveram melhores resultados

Improved outcome after lumbar microdiscectomy in patients shown their excised disc fragments: a prospective, double blind, randomised, controlled trial

M J Tait, J Levy, M Nowell, C Pocock, V Petrik, B A Bell, M C Papadopoulos



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – MODELOS DE RACIOCÍNIO


- Modelo BIOMÉDICO: pressupõe que toda dor tenha uma causa fisiológica/mecânica e que o profissional deva ser capaz de encontrar a causa e tratá-la
- **Modelo BIOPSISSOCIAL: entende que a causa tem uma interligação biológica, psicológica e social.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – MODELOS DE RACIOCÍNIO

- Anatomia e Biomecânica não são mais suficientes.
- Reabilitação inclui uma gama de abordagens: 1) educação, 2) terapia manual, 3) exercício, 4) mudanças de percepção, 5) mudanças de estilo de vida.
- **Modelo BIOMÉDICO pode ser adequado quando existe: 1) dor aguda, 2) lesão tecidual, 3) dor (mecanismo nociceptivo).**
- **Modelo BIOPSISSOCIAL (biológico – gênero, peso, sedentarismo / psicológico – estresse, bloqueio / social – educação, cultura, solidão) pode: 1) modular dor aguda, 2) modular dor crônica.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO

- **PRIMEIRO:** avaliar intensidade da dor (escala de 11 pontos).
- **SEGUNDO:** localização da dor através de diagrama e esquema corporal.
- **TERCEIRO:** duração (aguda ou crônica).
- **QUARTO:** questionários (psicossocial).
- **QUINTO:** mecanismo predominante (nociceptivo, neuropático e nociplástico + sistema de movimento).
- **SEXTO: diagnóstico.**
- **SÉTIMO: abordagem baseada em mecanismo da dor.**




NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
PRIMEIRO: avaliar intensidade da dor (escala de 11 pontos).

- Nota zero é ausência de dor
- Nota 10 é a dor mais insuportável que você já sentiu.



• Escalas Unidimensionais



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEGUNDO: localização da dor através de diagrama e esquema corporal.

- Paciente deve marcar as regiões do corpo onde senti dor. Em seguida fazer um desenho (orientação: “faça um desenho seu da maneira como percebe a dor”).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
TERCEIRO: duração (aguda ou crônica).



Resposta protetora normal e limitada pelo tempo. Acompanha a reparação do tecido. (Menos de 3 meses)

- Geralmente dano óbvio no tecido
- Serve como uma função protetora
- Gera um aumento da atividade do sistema nervoso periférico
- A dor cessa com a cicatrização

Dor que persiste além do tempo normal de reparação do tecido (Geralmente de 3-6 meses)

- Sem causa periférica aparente
- Não tem função protetora
- Degrada a saúde e a capacidade
- O sistema nervoso central torna-se mais sensível às mensagens de perigo.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
QUARTO: questionários (psicossocial).

The Clinical Journal of Pain Publish Ahead of Print
DOI:10.1097/AJP.0000000000000514

BRIEF PSYCHOLOGICAL SCREENING QUESTIONS CAN BE USEFUL FOR RULING
OUT PSYCHOLOGICAL CONDITIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN

- MEDO DO MOVIMENTO: “Exercício Físico pode piorar” 0 (discordo completamente) a 10 (concordo completamente).
- SONO: “Você teve problemas de sono no mês passado? 0 (nada), 1 (um pouco), 2 (alguns), 3 (sério).
- **ANSIEDADE: “Você se sente ansioso? 0 (nada) a 10 (muito).**
- **DEPRESSÃO: “Durante o último mês você esteve incomodado por sentir-se deprimido (falta de interesse ou prazer em fazer as coisas)?” 0 (nada) a 10 (todo o tempo).**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO

QUARTO: questionários (psicossocial).

- ISOLAMENTO SOCIAL: “Você se senti socialmente isolado?” 0 (nada) a 10 (completamente).
- CATASTROFIZAÇÃO: “Nunca vou melhorar” 0 (nunca faço isso) a 10 (sempre faço isso)
- **ESTRESSE: “Você se sente estressado?” 0 (nem um pouco) a 10 (completamente)**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO

QUINTO: mecanismo predominante (nociceptivo, neuropático e nociplástico + sistema de movimento).


- SISTEMA DE MOVIMENTO: é individualizado.
- SISTEMA DE MOVIMENTO: pode variar de SUTIS a GRAVES.
- **SISTEMA DE MOVIMENTO: pode variar de INIBIÇÃO MOTORA (fraqueza) a FACILITAÇÃO MOTORA (espasmo).**
- **SISTEMA DE MOVIMENTO: a Disfunção Motora é resultado direto da dor (VOLUNTÁRIO) ou adaptação a longo prazo (INVOLUNTÁRIO). Se for um resultado direto da dor, reduzindo a dor provavelmente restaurará o padrão de movimento**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – SISTEMA DE MOVIMENTO (Avaliação da Função do Sistema de Movimento em Relação a Dor).

- **Quatro adaptações do sistema de movimento à dor e como eles podem afetar um programa de exercícios.**
- **A fase de cicatrização (agudo ou crônico) influencia na maneira de tratar uma adaptação motora.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – SISTEMA DE MOVIMENTO (Avaliação da Função do Sistema de Movimento em Relação a Dor).

• Escala Funcional Específica do paciente:

Leia na avaliação inicial
Eu vou pedir para você identificar até 3 atividades importantes que você está incapaz de fazer ou tem dificuldade de realizar como resultado do seu problema. Hoje, há alguma atividade que você está incapaz de fazer ou tem dificuldade de realizar por causa de seu problema? (mostre a escala)

Leia nas visitas seguintes
Quando eu avaliar você (diga a data da avaliação anterior), você me disse que tinha dificuldades com (leia 1, 2, 3 da lista). Hoje você ainda tem dificuldade com a atividade 1 (solicite ao paciente dar nota a essa atividade); 2 (solicite ao paciente dar nota a essa atividade); 3 (solicite ao paciente dar nota a essa atividade).

Esquema de notas (mostre a escala ao paciente):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

0 Incapaz para realizar a atividade

10 Capaz de realizar a atividade como você realizou a antes da lesão.

Atividade	Data/nota
1.	Baseline
2.	
3.	



NEUROCIÊNCIA DA DOR

Dor lombar crônica x saudáveis



A RNM do cérebro foi realizada para todos os indivíduos enquanto eles mostravam uma foto de um homem levantando uma carga.

Todos os indivíduos com dor lombar relataram sentir desconforto e 7 indivíduos relataram sentir dor.

Ativação do área cortical relacionada à dor e emoções: a ínsula, área motora suplementar, área pré-motora, tálamo, córtex cingulado posterior, hipocampo, giro e cerebelo.

Visualization of Painful Experiences Believed to Trigger the Activation of Affective and Emotional Brain Regions in Subjects with Low Back Pain

Kazuhiro Shimo¹, Takefumi Ueno², Jarred Younger³, Makoto Nishihara¹, Shinsuke Inoue¹, Tatsunori Ikemoto⁴, Shinichirou Taniguchi⁵, Takahiro Ushida^{1,5*}



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NOCICEPTIVA**:
presença de 3 sintomas (5, 8, 11), a
“ausência” de 3 sintomas (7, 15, 18) e 1
sinal (27).

- **3 sintomas**:
_ **Geralmente intermitente e precisa com o movimento / provocação mecânica; pode ser uma dor maçante ou pulsante e constante em repouso;**
_ **Dor localizada na área da lesão/disfunção (com/sem referência somática);**
_ **Natureza mecânica/anatômica clara e proporcional aos fatores que aliviam**

ORIGINAL ARTICLE

The Discriminative Validity of “Nociceptive,”
“Peripheral Neuropathic,” and “Central Sensitization” as
Mechanisms-based Classifications of Musculoskeletal Pain

Keith M. Smart, PhD,* Catherine Blake, PhD,† Anthony Staines, PhD,‡
and Catherine Dwyer, PhD†



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NOCICEPTIVA**:
presença de 3 sintomas (5, 8, 11), a
“ausência” de 3 sintomas (7, 15, 18) e 1
sinal (27).
- **Ausência de 3 sintomas e 1 sinal:**
_dor descrita de várias formas como
queimação, pontada, intensa (forte) ou
semelhante a um choque elétrico;
_dor associada a outras disestesias (ex:
pressão, formigamento, choque);
_dor noturna / sono perturbado;
_posturas / padrões de movimento antálgicos.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NOCICEPTIVA**:
presença de 3 sintomas (5, 8, 11), a
“ausência” de 3 sintomas (7, 15, 18) e 1
sinal (27).
- **O preditor mais forte foi o critério 8.**
Sugerindo que os pacientes com “dor
localizada na área da lesão/disfunção
(com/sem referência somática)”
apresentam mais de 69 vezes a
probabilidade de serem classificados com
predominância de dor nociceptiva do que
dor não nociceptiva.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NEUROPÁTICA**:
presença de 3 critérios (3, 9, 29).

- **3 critérios:**

_história de lesão nervosa, patologia ou comprometimento mecânico;

_dor referida em distribuição cutânea ou dermatomo;

_provocação de dor/sintomas com testes mecânicos / de movimento que movem/comprimem o tecido neural.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NEUROPÁTICA**:
presença de 3 critérios (3, 9, 29).

- **O preditor mais forte foi o critério 9. Sugerindo que os pacientes com “dor referida em distribuição cutânea ou dermatomo” apresentam mais de 24 vezes a probabilidade de serem classificados com predominância de dor neuropática do que nociceptiva.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO

SEXTO: diagnóstico.

Questionário ND4 –
dor neuropática

Nas quatro perguntas abaixo, complete o questionário marcando uma resposta para cada número.

ENTREVISTA COM O PACIENTE		
Questão 1: A sua dor tem uma ou mais das seguintes características?		
1 – Queimação	() SIM	() NÃO
2 – Sensação de frio dolorosa	() SIM	() NÃO
3 – Choque elétrico	() SIM	() NÃO
Questão 2: Há presença de um ou mais dos seguintes sintomas na mesma área da sua dor?		
4 – Formigamento	() SIM	() NÃO
5 – Alfinetada e agulhada	() SIM	() NÃO
6 – Adormecimento	() SIM	() NÃO
7 – Coceira	() SIM	() NÃO
EXAME DO PACIENTE		
Questão 3: A dor está localizada numa área onde o exame físico pode revelar uma ou mais das seguintes características?		
8 – Hipoestesia ao toque	() SIM	() NÃO
9 – Hipoestesia à picada de agulha	() SIM	() NÃO
Questão 4: Na área dolorosa, a dor pode ser causada ou aumentada por:		
10 – Escovação	() SIM	() NÃO
Escore	Dor nociceptiva (<4) ()	Dor neuropática (>=4) ()



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO

SEXTO: diagnóstico.

- **DOMINÂNCIA de Dor NOCIPLÁSTICA:**
presença de 3 sintomas (4, 13, 25) e 1 sinal (33).
- **3 sintomas e 1 sinal:**
 _dor desproporcional a natureza e extensão da lesão ou patologia;
 _padrão de dor desproporcional, não mecânica e imprevisível de provocação em resposta a vários fatores agravantes/facilitadores;
 _forte associação com fatores psicossociais mal adaptativos;
 _áreas difusas de dor/sensibilidade a palpação.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NOCIOPLÁSTICA**: presença de 3 sintomas (4, 13, 25) e 1 sinal (33).
- **O preditor mais forte foi o critério 13. Sugerindo que os pacientes com “padrão desproporcional, não-mecânico e imprevisível de provocação da dor em resposta a múltiplos fatores agravantes/facilitadores não específicos” apresentam mais de 30 vezes a probabilidade de serem classificados com predominância de dor nocioplástica do que dor não nocioplástica.**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- DOMINÂNCIA de Dor **NOCIOPLÁSTICA**: presença de 3 sintomas (4, 13, 25) e 1 sinal (33).
- **Na ausência de um padrão-ouro para diagnóstico, a melhor alternativa é o julgamento clínico especializado (expertise).**



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- Testes sensoriais quantitativos + instrumento:

_Modulação condicionada da dor (CPM).

_Somação temporal.

_Inventário de sensibilização central.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

Avaliação sensorial


- Limiar de dor por pressão – algômetro
- Hiperalgisia profunda mecânica



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

Hiperalgisia mecânica: primária ou secundária → Hiperalgisia primária (no local da dor)



→ Hiperalgisia terciária (em outro membro)

Hiperalgisia secundária (fora do local da dor)



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

HUBERT VAN GRIENSVEN, MSc (Pain), PhD, MCSP, DipAc¹ • ANNINA SCHMID, M Manip Ther, PhD, MMAPCP, MCSP²
TEODORA TRENDAFILOVA, BSc (Hons)² • MATTHEW LOW, BSc (Hons), MSc, MMAPCP, MCSP²

Central Sensitization in Musculoskeletal Pain: Lost in Translation?

Dor contínua, espontânea, sem padrão de alívio/agravo e generalizada ou dor intensa e prolongada após um estímulo inócuo.

- **Hiperalgisia primária:** predomínio periférico (no local da lesão tecidual), aumento de sensibilidade no local da lesão.
- **Hiperalgisia secundária:** predomínio espinal (arredores do local da lesão). Aumento da sensibilidade nos arredores da área de lesão.
- **Hiperalgisia terciária:** Predomínio supra-espinal (sensibilidade aumentada no membro contralateral).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

Tipo	Localização	Causa Principal	Exemplo
Hiperálgia Primária	No local da lesão	Sensibilização periférica	Queimadura, corte inflamado
Hiperálgia Secundária	Ao redor da lesão	Sensibilização central	Cirurgia, lesão nervosa
Hiperálgia Terciária	Áreas distantes	Neuroplasticidade anormal	Fibromialgia, dor crônica generalizada



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

- **Alodinia mecânica dinâmica:** resposta aumentada a estímulos inócuos repetidos no local da área de lesão;
- **Somação temporal:** resposta aumentada a estímulos nocivos repetidos dentro do mesmo campo receptivo;
- **Modulação condicionada da dor:** um teste que pode refletir a eficácia da inibição descendente da dor.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

Modulação condicionada da dor: “dor inibe dor”

- É um fenômeno que envolve um estímulo nocivo que produz uma diminuição em grande escala da dor fora da área do estímulo e geralmente mede a integridade dos sistemas inibidores da dor endógena.
- Esse mecanismo inibitório da dor opera por meio da ativação das vias inibitórias supraespinhais descendentes iniciadas pela liberação de opióides endógenos.

EJP
European Journal of Pain

ORIGINAL ARTICLE

Transcutaneous electrical nerve stimulation and conditioned pain modulation influence the perception of pain in humans

R.E. Liebano¹, C.G. Vance², B.A. Rake³, J.E. Lee², N.A. Cooper², S. Marchand⁴, D.M. Walsh⁵, K.A. Sluka²

¹ Master's and Doctoral Programs in Physical Therapy, Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), São Paulo, Brazil

² Graduate Program in Physical Therapy & Rehabilitation Science, College of Medicine, University of Iowa, USA

³ College of Nursing, University of Iowa, USA

⁴ Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke, Canada

⁵ Health and Rehabilitation Sciences Research Institute, University of Ulster, UK



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

Modulação condicionada da dor: “dor inibe



PAIN[®] 149 (2010) 573–581

PAIN[®]

www.elsevier.com/locate/pain

Sensitization in patients with painful knee osteoarthritis

Lars Arendt-Nielsen^{a,*}, Hongling Nie^a, Mogens B. Laursen^c, Birgitte S. Laursen^b, Pascal Madeleine^a, Ole H. Simonsen^c, Thomas Graven-Nielsen^a

^aCenter for Sensory Motor Interaction (SMI), Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark

^bClinical Nursing Research Unit, Hørslev 18-22, Aalborg Hospital, DK-9000 Aalborg, Denmark


^cNorthern Orthopaedic Division, Hørslev 18-22, Aalborg Hospital, DK-9000 Aalborg, Denmark



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico - MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM)


- A percepção da dor pode aumentar ou diminuir através dos estímulos nocivos;
- MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM) busca “inibir a dor através da dor” (teste em repouso) ou “inibir a dor através do exercício” (teste ativo)



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico - MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM)


- 1) Estímulo Teste (algômetro – pré teste);
- 2.1) Estímulo Nocivo Repouso (térmico ou pressórico);
- 2.2) Estímulo Nocivo Ativo (aeróbico)
- 3) Estímulo Teste (algômetro – pós teste).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico - MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM)


- 1) Estímulo Teste (algômetro – pré teste e pós teste): a- limiar de dor a pressão, b- 3 regiões distintas (local, sistêmica proximal e sistêmica local), c- 3 estímulo teste por região, d- 1 kg/força por segundo.
- ATENÇÃO retirar o algômetro na transição entre a percepção de pressão e dor.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico - MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM)

- 2.1) Estímulo Nocivo Repouso (térmico ou pressórico): a- TÉRMICO ativados quando MAIS de 45 graus ou MENOS de 5 graus.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico - MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM)

- **Interpretando os resultados:**

_limiar de dor IGUAL ao pré teste: inibição endógena funcional caso o Limiar de Dor a Pressão no Estímulo Pré Teste for acima de 2kg por área avaliada.

_limiar de dor MAIOR que o pré teste: inibição endógena funcional (não comprometido / anti-nociceptivo).

_limiar de dor MENOR que o pré teste: inibição endógena comprometida (pró nociceptivo).

- **O mal funcionamento da MODULAÇÃO CONDICIONADA DA DOR (CPM) pode ser a causa do desenvolvimento da dor crônica.**





NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico.

Somação Temporal (Arendt-Nielsen et al, 2015)


- Refere-se ao aumento da percepção de dor de repetitivos estímulos nocivos.



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico – SOMAÇÃO TEMPORAL


- **SOMAÇÃO TEMPORAL** é fenômeno que provoca aumento progressivo da intensidade da dor durante a repetição de estímulos nocivos com intervalos idênticos (ex: 3 estímulos intervalados a cada 5 segundos).



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico – SOMAÇÃO TEMPORAL

- **Interpretando os resultados:**
 - _havendo aumento progressivo da intensidade da dor: inibição endógena comprometida (pró nociceptivo).
 - ___não havendo aumento progressivo da intensidade da dor: inibição endógena funcional (anti nociceptivo).



PAIN[®] 155 (2014) 663–665

www.elsevier.com/locate/pain

Topical review

Pain modulation profile and pain therapy: Between pro- and antinociception

David Yarnitsky^{a,b,*}, Michal Granot^c, Yelena Granovsky^{a,b}

Pacientes com Somação temporal aumentada são considerados potenciais para agravar a experiência de dor quando alguma condição se desenvolver.

Yarnitsky *et al*, 2014.

NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico – SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

- 40/100 permite a identificação correta de mais de 82% dos paciente com Sensibilização Central

PARTE A

1. Sinto-me cansado (a) ao acordar pela manhã.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
2. Sinto que minha musculatura está enrijecida e dolorida.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
3. Tenho crises de ansiedade.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
4. Costumo apertar (ranger) os dentes.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
5. Tenho diarreia e/ou prisão de ventre.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
6. Preciso de ajuda para fazer as tarefas diárias.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
7. Sou sensível à luminosidade excessiva.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
8. Canso-me facilmente ao realizar atividades diárias que exijam algum esforço físico.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
9. Sinto dor em todo o corpo.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
10. Tenho dores de cabeça.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
11. Sinto desconforto e/ou ardência ao urinar.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
12. Durmo mal.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
13. Tenho dificuldade para me concentrar.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
14. Tenho problemas de pele como ressecamento, coceira e vermelhidão.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre
15. O estresse piora meus sintomas.	0 Nunca	1 Raramente	2 Às vezes	3 Frequentemente	4 Sempre



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico – SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

16. Me sinto triste ou deprimido(a).	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
17. Tenho pouca energia.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
18. Tenho tensão muscular no pescoço e nos ombros.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
19. Tenho dor no queixo.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
0. Fico enjoado (a) e tonto (a) com cheiros como o de perfumes.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
21. Preciso urinar frequentemente.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
22. Quando vou dormir à noite sinto minhas pernas inquietas e desconfortáveis.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
23. Tenho dificuldade para me lembrar das coisas.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
24. Sofri trauma emocional na infância.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
25. Tenho dor na região pélvica.	0 <i>Nunca</i>	1 <i>Raramente</i>	2 <i>Às vezes</i>	3 <i>Frequentemente</i>	4 <i>Sempre</i>
TOTAL:					



NEUROCIÊNCIA DA DOR

DOR – PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
SEXTO: diagnóstico – SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL

Você recebeu de algum médico algum (s) diagnóstico (s) dos citadas abaixo?

Preencha as colunas da direita para cada diagnóstico.

PARTE B	<i>Não</i>	<i>Sim</i>	<i>Ano do Diagnóstico</i>
1. Síndrome das pernas inquietas.			
2. Síndrome da fadiga crônica.			
3. Fibromialgia.			
4. Disfunção da articulação temporomandibular (ATM).			
5. Enxaqueca ou cefaleia tensional.			
6. Síndrome do intestino (cólon) irritável.			
7. Hipersensibilidade química (ex. poeira, cosméticos, poluição).			
8. Lesão cervical (incluindo lesão de chicote).			
9. Ansiedade ou ataques de pânico.			
10. Depressão.			



INVISTA NO SEU FUTURO

ANAFISIOM compartilha constantemente conteúdo educativo relacionado a Fisioterapia Manipulativa nas suas redes sociais, não deixe de acompanhar!



ANAFISIOM
Academia Nacional de Fisioterapia Manipulativa



/anafisom



@anafisom